

1. Acer palmatum

China, Korea, Japan, Taiwan

vorm/hoogte	Struik of kleine boom, langzame groeier, fijne structuur, 10m
blad/twijn	Twijn: dun, kaal, vaak rood. Blad: (K)TO , 5-9 lobben, handdelig, rand fijn dubbelgezaagd. Variabele herfstkleur, rood of geel.
bloei	Mei-juni. Bloem: witte bloempjes met rode bloemkelken in tuilen
vrucht	Samara, stompe hoek, rood-groen
grond	Humeus, vochtoudend en doorlatend, niet te zwaar. Lichtzuur tot basisch. Vooral niet te nat.
standplaats	Bij voorkeur halfschaduw. Beschut. Vooral jonge planten gevoelig voor zonnebrand. Gevoelig voor (zee-)wind en late nachtvorst
opmerkingen	Palmatum=handvormig. Gevoelig voor Verticillium (te nat) en meniezwammetje (bij snoeiwonden). De cv ' Atropurpureum ' heeft roodbruin blad en rode herfstkleur. Niet snoeien in het voorjaar, bij voorkeur helemaal geen snoei.

1. Acer palmatum

Japanse esdoorn

Aceraceae, Esdoornfamilie, óf Sapindaceae



Dunne, vaak rode
tweigen, TO bladstand,
handdelig blad

zomerblad



Acer palmatum
'Atropurpureum', zomerblad



Vrucht: Samara



herfstblad



Bloeiwijze in
mei-juni