

4. Acer pseudoplatanus

Midden- en Zuid-Europa, West-Azië, inheems in Zuid Limburg

vorm/hoogte	Breed piramidale, hoog-ronde kroon.25m
blad/twijn	Twijn: grijsgroen. Blad: KTO , handspletig, spits gezaagde lobben, boven dof groen, rimpelig, ruw, onder blauwgroen. Iets gele herfstkleur.
bloei	Begin mei. Bloem: hangende tros geelgroene bloemen.
vrucht	Samara met rechte tot stompe hoek.
grond	Alle. Van nature op vochtige, voedselrijke grond (en dan ook veel zaailingen).
standplaats	Zon, halfschaduw. In de jeugd ook schaduw. Verdraagt (zee-) wind en gesloten wegdek. Geen strooizout. Gevoelig voor voorjaarsvorst.
opmerkingen	Diepgaand goed vertakt wortelstelsel. Soms last van inktvlekkenziekte, bladgal en bladluis. Pseudoplatanus=bedrieglijk op een Platanus gelijkend.

4. Acer pseudoplatanus

Gewone esdoorn



Handspletig blad



Hangende
bloeiwijze

Verskil tussen *Acer platanoides* en *Acer pseudoplatanus*



***Acer platanoides*:**


Twijg: bruin en (groen-)rode knop.

Blad: wijd-getande lobben, glad

Bloem: opstaande tuil

Vrucht: horizontale vleugels

Bast: gegroefd



***Acer pseudoplatanus*:**

Twijg: grijsgroen en groene knop.

Blad: gezaagde lobben, ruw

Bloem: hangende tros

Vrucht: vleugels stompe hoek

Bast: platanachtige afschilfering