

16. Centranthus ruber

Zuid-Europa, lokaal verwilderd in Nederland

vorm/hoogte	Sterk vertakte opgaande plant. 30-80cm
blad	Ovaal en lancetvormig, TO, gaafrandig, zowel gesteeld als zittend, blauwgroen berijpt.
bloei	Mei-september. Pluimen met rode <i>gespoorde</i> bloempjes. (sporen bij bloemen: met nectar gevuld en vergroeid bloemblad)
vrucht	Zaaddoos. Zaait zich uit.
grond/stand-plaats	Zon, halfschaduw. Alle doorlatende (droge) voedzame, evt. kalkrijke bodems. Verdwijnt bij natte grond.
bijzonderheden	Ruber=rood. Kentron=spoor, anthos=bloem. Blad en wortels zijn eetbaar. De cv 'Albus' is wit. 's Winters blijven plantdelen dichtbij de grond groen. Invasief in Zuid-Afrika N.B. Vroeger ook wel Rode valeriaan genoemd, maar dit is verwarrend; Echte Valeriaan is een ander geslacht: <i>Valeriana officinalis</i> .

16. Centranthus ruber

Spoorbloem

Caprifoliaceae, Kamperfoeliefamilie



Blad: ovaal zittend en
lancetvormig gesteeld

