27. Rhus typhina

Noord-Amerika

vorm/hoogte	Breed opgaande **2-huizige** struik (kleine boom), 4-5m
blad/twijg	Twijg: behaard (bruin, later rood), broos, bevat giftig melksap. Blad: geveerd (tot 40cm), 6-15 paar deelblaadjes, ongesteeld, behaarde bladspil, groen. Herfstkleur scharlakenrood
bloei	Juni-juli. Opstaande bloempluimen, crème-wit. Vrl bloempluimen smaller en ronder, mnl meer piramidaal en gepunt.
vrucht	Rode opstaande vruchtkolven(alleen bij vrl bomen!), behaard, lang aanblijvend. Verzameling kleine steenvruchten.
grond	Alle, ook droge en kalkhoudende.
standplaats	Zon, halfschaduw. Gevoelig voor takbreuk bij wind.
opmerkingen	Typhinus=Typha-achtig (Typha is Lisdodde). Maakt veel worteluitlopers.


27. Rhus typhina

Fluweelboom, Azijnboom

Anacardiaceae, Pruikenboomfamilie







Tak sterk behaard





Boven: De kenmerkende rode vruchtkolven van de vrl plant (tweehuizig!).



Links: vaak meerstammige boom, vaasvormige habitus, mooie herfstkleur.