

34. Salix alba

Europa, Noord-Azië, inheems

vorm/hoogte	Boom met eivormige kroon, 25m; ook in knotvorm en in grienden struikvormig . Snelgroeiend; gegroefde bast.
blad/twijn	Twijn: eerst behaard, later kaal. Blad: verspreid staand, grijsgroen lancetvormig, 4-10cm; fijngezaagd, onderzijde zilverig behaard
bloei	April-mei. Tweehuizig . Lange smalle mnl of vrl katjes (met honingklieren - drachtplant). Bloei is gelijk met uitlopen blad.
vrucht	Doosvrucht met behaarde zaden (zaadpluizen) in juni.
grond	Vochtige grond, van nature in stromend (rivier-)water. Vruchtbare lemige bodem.
standplaats	Zon. Verdraagt wind (geen zeewind). Gevoelig voor watermerkziekte. Zeer goed snoeibaar.
opmerkingen	Alba=wit. In de bast van de wilg zit salicylzuur, een grondstof van aspirine. Diverse cv's met kleurrijke twijgen (geel, oranje, rood).

34. Salix alba

Schietwilg

Salicaceae, Wilgenfamilie



Knotwilg snoei: jan-
april, elke 3-8 jaar



Wintertwijn en
knop



vruchtpluis



Salix alba